

## Emaka limaskesta retseptiivsuse test

Patsiendi infomaterjal

Käesoleva infolehe eesmärk on tutvustada emaka limaskesta retseptiivsuse testi.

### Üldinfo

Emaka limaskesta retseptiivsuse testi tegema suunab Teid ambulatoorsel vastuvõtul viljatusravikeskuse naistearst. Test on tasuline. Hinna kohta leiate infot AS Ida-Tallinna Keskhaigla kodulehelt [www.itk.ee](http://www.itk.ee). Test tehakse vastuvõtul kokkulepitud ajal AS Ida-Tallinna Keskhaigla Tõnismäe üksuses asuvas viljatusravikeskuses (Hariduse 6).

Kui Teil on küsimusi või soovite lisateavet, palume helistada viljatusravikeskuse infotelefonil 5919 8395 (E-R 8.00-15.00).

### Emaka limaskesta retseptiivsuse testi eesmärk ja olemus

Emaka limaskesta retseptiivsuse testi eesmärk on hinnata emaka limaskesta vastuvõtlikkust ehk retseptiivsust embrüo kinnitumisele ning määrata embrüo siirdamise individuaalne aeg ehk implantatsiooniaken.

Emaka limaskest on embrüo kinnitumiseks valmis lühikest aega, 6–8 päeva pärast ovulatsiooni. Seda perioodi nimetatakse implantatsiooniaknaks ja see kestab menstruatsioonitsükli 19.–21. päevani.

Emaka limaskesta retseptiivsuse testiga analüüsitakse emaka limaskesta vastuvõtlikkuse protsessis osalevate geenide avaldumise taset. Geeni avaldumise taseme väärtustest lähtudes on emaka limaskest vastuvõtlik või mittevastuvõtlik.

### Emaka limaskesta retseptiivsuse testi näidustused

Emaka limaskesta retseptiivsuse test on mõeldud naistele, kellel on korduvalt embrüo siirdamine ebaõnnestunud:

- morfoloogiliselt hea kvaliteediga embrüoga;
- ebaselgetel põhjustel vaatamata visuaalselt normaalsele emakale ja emaka limaskesta koe paksusele.

## **Protseduuri käik**

Testiks vajalik koeproov võetakse ambulatoorsel vastuvõtul. Te istute günekoloogilisele toolile. Naistearst võtab peenikese kateetriga (Pipelle) emaka limaskestast koetüki (bioptaadi) ja asetab selle krüoviaali.

Protseduuri tegemiseks ei ole vaja narkoosi. Protseduuri käigus võib tunda kerget ebamugavustunnet ja valulikkust, võib tekkida verine voolus.

## **Emaka limaskesta uuringu tulemused**

Kui emaka limaskest on koeproovi võtmise päeval embrüo vastuvõtmiseks valmis, siis see aeg ongi implantatsiooniaken ning embrüo tuleb siirata järgmise menstruatsioonitsükli samal päeval, kui toimus koeproovi võtmine.

Emaka limaskesta retseptiivsuse testi tulemused valmivad 15 tööpäeva jooksul pärast koeproovi võtmist, millest arst teavitab Teid telefoni teel. Testi tulemuse saate teada arsti vastuvõtul.

ITK778

Kinnitatud AS ITK ravikvaliteedi  
komisjoni 29.05.2019 otsusega  
(protokoll nr 9-19)