



ПУНКЦИЯ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ

Пункция плевральной полости проводится как с диагностической, так и с лечебной целью при образовании жидкости в плевральной полости. Плеврой называется оболочка, которая с одной стороны покрывает легкое, а с другой – внутреннюю стенку грудной клетки. Пространство между ними называется плевральной полостью. Жидкость в плевральной полости может образовываться при ряде заболеваний систем органов, включая болезни легких и сердца. Исследование жидкости, полученной в ходе пункции, позволяет уточнить диагноз. Если в плевральной полости скопился большой объем жидкости, то ее удаление часто помогает улучшить состояние.

Процедура проводится по определенному показанию, на процедуру направляет лечащий врач.

Противопоказанием к процедуре является нарушение свертываемости крови.

Перед проведением процедуры обязательно сообщите своему врачу, если:

- Вы принимаете антикоагулянты. Может потребоваться временно прекратить прием этих лекарств, если Ваш врач скажет Вам об этом;
- у Вас аллергия на анестетики, такие как лидокаин для анестезии.

Во время процедуры:

- Вас попросят обнажить исследуемый участок тела, поэтому отправляясь на процедуру, желательно одеться так, чтобы Вам было удобно раздеться;
- во время процедуры Вы будете сидеть в наиболее удобном положении, опираясь руками на спинку стула;
- под контролем ультразвука врач выберет место пункции на коже;
- кожу в области пункции продезинфицируют, в область пункции будет сделан укол обезболивающего лекарства;
- затем врач введет через стенку грудной клетки, между двумя ребрами, в плевральную полость пункционную иглу, и с ее помощью удалит скопившуюся там жидкость;
- на место прокола будет наложена стерильная повязка, которую можно снять через 72 часа.

Возможные осложнения:

- подкожный кровоподтек;
- кровотечение в плевральной полости;
- пневмоторакс;
- повреждение соседних органов (печень, селезенка, сердце);
- повреждение нервов;
- развитие инфекции.

Выполнение процедуры под контролем УЗИ значительно снижает риск осложнений. Если у Вас есть какие-либо осложнения (затрудненное дыхание, сильная боль, высокая температура), обратитесь к врачу или в отделение неотложной помощи.

После процедуры Вы можете продолжить свою повседневную деятельность, если врач не распорядится иначе. Касательно вопросов, дополнительной информации или ответов на обследование обращайтесь к лечащему врачу.