



STEREOTAKTILINE BIOPSIA

Stereotaktiline biopsia on protseduur, mille käigus võetakse rinnakoest koetükke rinnanäärme röntgenuuringu ehk mammograafia kontrolli all. Stereotaktiline (mitmemõõtmelise kujutisega) protseduur võimaldab ultrahelist täpsemalt määratleda lubjastunud koldeid rinnanäärmes ja seejärel sealt koetükke võtta (biopsia). Biopsia on vajalik diagnoosi kinnitamiseks või välistamiseks.

Protseduuri käigus võetud koetükid saadetakse laborisse histoloogilisele uuringule.

Näidustused

- Mammograafial ja ultraheli uuringul leitud kahtlase kolde diagnoosi täpsustamine;
- beniigse (healoomulise) või maliigse (pahaloomulise) rinnahaiguse eristamine;
- põletikulise muutuse eristamine kasvajalisest muutusest.

Vastunäidustused

Kui Te tarvitate verd vedeldavaid ravimeid (nt aspiriin, südameaspiriin, marevan jm) teavitage sellest arsti. Ravimite tarvitamine enne protseduuri teostamist tuleb ajutiselt peatada. Teavitage arsti kui Teil on esinenud allergiat tuimastusaine Lidokaiini suhtes.

Protseduuriks ettevalmistus

Protseduuri teostamise hommikul võib süüa ja juua. Protseduuri ajal tuleb paljastada uuritav piirkond, seetõttu on soovitatav uuringule tulles riietuda nii, et lahti riietumine oleks mugav.

Protseduuri teostamine

Te istute või lamate spetsiaalsel biopsiavõtmise toolil. Protseduuri ajal on uuritav rind fikseeritud kahe plaadi vahele. Enne koetüki võtmist tuimastatakse rinnapiirkond, mis teeb kogu protseduuri valutuks.

Jämenõelbiopsial kasutatakse spetsiaalset nõela, mis biopsiapüstoli abil lõikab rinnakoest väikesi koetükke. Koetükkide võtmise käigus on kuulda plaksuvat heli, mida tekitab proovitükkide võtmise seade.

Tavaliselt võetakse 2–5 koetükki, mis saadetakse edasi histoloogia laborisse. Protseduuri teostab vastava väljaõppega radioloog ja radioloogiatehnik. Protseduur kokku kestab umbes 40 minutit.

Võimalikud tüsistused ja ohud

- Verevalum torkekohal,
- allergiline reaktsioon tuimastusainele,
- verejooks või põletik biopsia piirkonnas.

Kodune enesehooldus

- Jätke plaaster torkekohale järgmise päevani.
- Protseduuri teostamise päeval ärge minge sauna või vanni.
- Vältige füüsilist aktiivsust (sportimine, raskuste tõstmine jne).
- Valu korral eelistage paratsetamooli sisaldavaid ravimeid.
- Valu aitab leevendada ka külmakott, mis asetage rinnale riidesse või käterätti mähitult korraga umbes 10 minutiks.

Uuringutulemused

Uuringu läbi viinud radioloog sisestab protseduuri käigu patsiendi elektroonilisse haigusloosse. Histoloogia labori vastus saabub 8–10 tööpäeva jooksul ning tulemuse saate teada oma raviarstilt.