



EMAKAKAELA KONISATSIION


Emakakaela konisatsioon on kirurgiline ravimeetod, mille käigus eemaldatakse emakakaela välimisest osast koonusekujuline koetükk.

Emakakaela konisatsiooni eesmärgiks on eemaldada emakakaelast osa, milles on eelnevate uuringutega leitud muutunud epiteelirakke. Muutunud rakkude eemaldamine on vajalik vältimaks nende edasiarenemist emakakaela pahaloomuliseks kasvajaks. Enamasti on muutused emakakaela katvates rakkudes tekitatud papilloomviiruse (HPV) poolt. On leitud, et teatud alatüüpi papilloomiviirused on teistest ohtlikumad ning põhjustavad oluliselt sagedamini emakakaelavähi arengut.

Protseduuri kulg:

- Emakakaela konisatsioon teostatakse lühiajalises üldnarkoosis
- Emakakaela osa eemaldamiseks kasutatakse elektrinuga, võimalik tekkiv veritsus suletakse õmbluste või diatermokoagulaatoriga (kõrvetamisega) ning tuppe asetatakse tampoon
- Eemaldatud emakakaela osa saadetakse histoloogilisele uuringule, mille vastus saabub ~2 nädala jooksul raviarstile. Histoloogiline uuring võimaldab täpsustada rakulisi muutusi ja nende ulatust.

Saadud informatsiooni alusel koostab arst edasise plaani ravi ja jälgimise osas.



Konisatsiooniga seotud võimalikud tüsistused:

- Verejooks emakakaela haavast (1:10). Ohtlikum periood on esimene protseduurijärgne ööpäev. Võib vajada korduvat õmblemist või diatermokoaguleerimist (kõrvetamist)
- Emakakaela puudulikkus protseduurile järgnevate raseduste ajal. Risk suureneb raseduste iseeneslikuks katkemiseks ja enneaegseks sünnituseks. Emakakaela puudulikkust saab raseduse ajal korrigeerida emakakaela tugiõmbluste asetamisega



Infomaterjal

- Harvem võib tekkida emakakaela või emakapõletik
- Üliharva võib tekkida emakakaela naabruses paiknevate organite vigastus
- Narkoosiga seotud tüsistused on eeskätt seotud organismi ülitundlikkusega ravimitele

Protseduuriga seotud tüsistuste vältimiseks:

- Palume Teid informeerida naistearsti
 - kõigist Teile teadaolevatest haigustest
 - Teie tervislikust seisundist
 - Teile teadaolevatest ülitundlikkusest ravimite suhtes
- Nõustuda tegema Teile raviarsti poolt määratud analüüsid ja uuringud ning ravi vastavalt raviarsti soovitusel
- Enne protseduuri on vajalik olla 6 tundi söömata, joomata, ei tohi suitsetada vältimaks happelise maosisu sattumist kopsu narkoosi ajal, mis võib osutada eluohtlikuks

Patsiendi meelespea

- Peale protseduuri jääte mõneks tunniks jälgimisele
- Tampoon tupest tuleb eemaldada samal päeval
- Narkoosijärgselt ei tohi autot juhtida 24 tundi
- Peale emakakaela konisatsiooni võib 2-4 nädala vältel esineda vähest veritsust ja ebameeldiva lõhnaga voolust
- Konisatsioonijärgselt on 4-6 nädala vältel keelatud kasutada tupetampoone (ka menstruatsiooni ajal) ning elada suguelu. Vältida raskuste tõstmist
- 4 nädala vältel ei ole soovitatav käia vannis ja ujumas
- Järelkontrolliks pöörduda naistearsti poole 1-2 kuu möödudes

Koostaja: Naiste- ja Lastekliinik

Koostatud /täiendatud /ülevaadatud 2010