



EMAKAÕÕNE PROOVIABRASIOON

Emakaõõne prooviabrasioon (emakaõõne puhastus) on protseduur, mille käigus eemaldatakse spetsiaalse instrumendiga (küretiga) emakaõõnt vooderdav limaskest. See emakalimaskesta kaabe on vajalik diagnoosi täpsustamiseks:

- menstruatsioonitsükli häired, ebaselge põhjusega emakaverejooksud
- verejooksud menopausijärgsel perioodil
- ultraheliuuringul avastatud emaka limaskesta patoloogia (nt polüüp) või selle kahtlus
- onkotsütoloogilisel uurinul ebatüüpiline tulemus

Protseduuri kulg:

- emakaõõne prooviabrasioon teostatakse lühiaegses narkoosiga tupe kaudu
- esmalt teostatakse günekoloogiline läbivaatus, et täpsustada emaka suurust ja asendit. Seejärel laiendatakse vajadusel emakakaelakanalit ning eemaldatakse emakaõõnest limaskest.
- Saadud emakaõõne kaabe saadetakse histoloogilisele uuringule, mille vastus saabub ~2 nädala jooksul raviarstile. Histoloogiline uuring võimaldab täpsustada rakulisi muutusi

Prooviabrasiooniga seotud võimalikud tüsistused:

- Verejooks, mis võib olla põhjustatud emaka kokkutõmmete häirumisest
- Emaka või emakakaela vigastus protseduuri käigus. Emakaseina vigastuse korral võib tekkida vajadus operatsiooniks
- Emaka ja väikese vaagna organite põletik, mis vajab antibakteriaalset ravi
- Narkoosiga seotud tüsistused on eeskätt seotud organismi ülitundlikkusega ravimitele

Protseduuriga seotud tüsistuste vältimiseks:

- palume Teid informeerida naistearsti
 - kõigist Teile teadaolevatest haigustest
 - Teie tervislikust seisundist
 - Teile teadaolevatest ülitundlikkusest ravimite suhtes
- Nõustuda tegema Teile raviarsti poolt määratud analüüsid ja uuringud ning ravi vastavalt raviarsti soovitusel
- Enne protseduuri on vajalik olla 6 tundi söömata, joomata, ei tohi suitsetada vältimaks happelise maosisu sattumist kopsu narkoosi ajal, mis võib osutada eluohtlikuks

Patsiendi meelespea

- peale protseduuri jääte mõneks tunniks jälgimisele
- narkoosijärgselt ei tohi autot juhtida 24 tundi
- ühe nädala vältel võib esineda vähene vereeritus tupest



nfomaterjal

- edasise raviplaani koostamiseks on vajalik pöörduda naistearstile 2 nädala möödudes

Koostaja: Laste- ja Naistekliinik

Koostatud/ täiendatud/ ülevaadatud 2010

