

Koostaja: kirurgiakliiniku õde Anzela Rementsova
2012

**Põiesisene ravi
BCG–medac ravimiga**

BCG-medac on ravim, mida kasutatakse kusepõiekasvaja ravis põiesisese immuunsuse stimuleerimiseks. Ravi alustatakse, kui kusepõiekasvaja eemaldamisest on vähemalt 2 nädalat möödas.

Vastunäidustused

- Kuseteede infektsioon,
- kusiti limaskesta kahjustus,
- kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkus (nt HIV),
- tuberkuloos,
- varasem kiiritusravi,
- lapse imetamise periood,
- rasedus.

Protseduurielsed juhised

Palun informeerige arsti, kui Teil on:

- palavik,
- alakõhuvalu,
- saagenud ja valulik urineerimine,
- uriinipidamatus,
- allergia tuimatusvahendite suhtes.

Juua ei või 4 tundi enne ja 2 tundi pärast protseduuri.

Enne BCG protseduuri tühjendage põis.

Protseduuri kulg

- Protseduur viiakse läbi günekoloogilisel toolil, Teid aidatakse sobivasse asendisse, alakeha peab olema paljas.
- Genitaalpiirkond puhastatakse antiseptilise lahusega.

- Kusiti tuimestatakse lidokaiingeeliga.
- Teile paigaldatakse kusepõiekateeter, mille kaudu viiakse BCG ravim.
- Ravim peab jääma põide vähemalt 2 tunniks.

Protseduurijärgsed juhised

Vähemalt kahe tunni jooksul peab ravim olema võimalikult ulatuslikus kokkupuutes kusepõie limaskestaga. Seetõttu peate pärast protseduuri lamama ja iga 15 minuti järel end seljalt kõhule ja vastupidi keerama. Kaks tundi pärast protseduuri peate põiest väljutama sisseviidud ravimi, soovitatavalt istudes.

Kui vastunäidustusi ei esine, soovitatakse teil 48 tunni jooksul pärast ravimi sisseviimist rohkelt juua (jooma hakata mitte varem kui 2 tundi pärast protseduuri), et soodustada uriini eritumist.

Võimalikud tüsistused

- Palavik üle 38 kraadi.
- Sage ja valulik urineerimine.
- Veri uriinis.

Kui Teil tekivad nimetatud kaebused, palun võtke ühendust protseduuri teostanud arstiga või oma perearstiga. Võimalik on pöörduda ka erakorralise meditsiini osakonda (EMO) aadressil Puusepa 8.

Uroloogia kabineti kontakttelefon: 7319 462