



EMAKAKAELA KOLPOSKOOPIA

Emakakaela kolposkoopia on uurimismeetod, mille käigus vaadeldakse kolpokoopiga (optiline, 10-40 kordset suurendust võimaldav aparaat) emakakaela katvat limaskesta. Selle abil võib sedastada muutusi, mis tupepeegluga vaatlusel ei ole nähtavad. Meetod võimaldab diferentsida erinevaid haiguslikke seisundeid emakakaelal. Kolposkoobi abil saab täpsustada proovitüki (biopsia) võtmise kohta.

Muutunud rakkude diagnoosimine on vajalik vältimaks nende edasiarenemist emakakaela pahaloomuliseks kasvajaks. Muutusi emakakaela katvates rakkudes tekitavad erinevad mikroobid, põhjustades emakakaela põletikku. On leitud, et teatud alatüüpi papilloomiviirused on teistest ohtlikumad ning põhjustavad oluliselt sagedamini emakakaelavähi arengut.

Proovitükist saadud vastusest sõltub edasine ravi. Healoomuliste muutuste korral teostatakse järgneval arstivisiidil emakakaela diatermokoagulatsioon („kõrvetamine“).

Protseduuri kulg:

- Emakakaela kolposkoopia teostatakse üldjuhul ilma narkoosita
- Emakakaela osa biopsia võtmiseks kasutatakse spetsiaalseid tange, mille abil on võimalik võtta mõne millimeetri suurune proovitükk. Tekkiv veritsus suletakse õmbluste või diatermokoagulaatoriga (kõrvetamisega) ning tuppe asetatakse tampoon
- Eemaldatud emakakaela osa saadetakse histoloogilisele uuringule, mille vastus saabub ~2 nädala jooksul raviarstile. Histoloogiline uuring võimaldab täpsustada rakulisi muutusi ja nende ulatust ning otsustada edasise ravitaktika üle

Kolposkoopiaga seotud võimalikud tüsistused:

- Verejooks emakakaela haavast. Ohtlikum periood on esimene protseduurijärgne ööpäev. Võib vajada õmblemist või diatermokoaguleerimist (kõrvetamist)
- Harvem võib tekkida emakakaela või emakapõletik
- Üliharva võib tekkida emakakaela naabruses paiknevate organite vigastus

Protseduuriga seotud tüsistuste vältimiseks:

- Palume Teid informeerida naistearsti
 - Kõigist Teile teadaolevatest haigustest
 - Teile teadaolevatest ülitundlikkusest ravimite suhtes (NB! ALLERGIA JOODILE)
- Nõustada tegema Teile raviarsti poolt määratud analüüsid ja uuringud ning ravi vastavalt raviarsti soovitusel

Patsiendi meelespea

- Tampoon tupest tuleb eemaldada samal päeval
- Peale emakakaela diatermokoagulatsiooni võib 2-4 nädala vältel esineda vähest veritsust ja ebameeldiva lõhnaga voolust



Infomaterjal

- Peale emakakaela diatermokoagulatsiooni on 4-6 nädala vältel keelatud kasutada tupetampoone (ka menstruatsiooni ajal) ning elada suguelu
- 4 nädala vältel ei ole soovitatav käia vannis ja ujumas
- Järelkontrolliks pöörduda naistearsti poole 1-2 kuu möödudes

Koostaja: Naiste- ja lastekliinik

Koostatud /Täiendatud /ülevaadatud 2010