

REKTOSKOOPIA

Uuringumeetod

Rektoskoopia on seedetrakti alaosa endoskoopia, mis võimaldab uurida pärasoolt (~20 - 30cm)Uuringuga saab välja selgitada kaebuste (näiteks alakõhuvalu, vereeritus soolest) põhjuseid ja/või leida silmaga nähtavaid haiguslikke muutusi pärasooles (näiteks haavandumised, põletik, kasvajad).

• Näidustused

Haavandi kahtlus, põletiku kahtlus
Polüübid, kasvajakasvaja protsessid
Stenootilised
Operatsiooni järgne seisundi hindamine

• Vastunäidustused

Koagulatsioonihäired (antikoagulante kasutavad haiged)
Perforatsioon
Profuusne verejooks

Uuringuks

ettevalmistus

Protseduurile eelneval päeval tühjendatakse soolestik vastavalt juhisele. Soovitavad preparaadid on Fortrans, X-prep. Protseduurile eelneva päeva lõunast tuleb olla söömata, juua tohib selgeid vedelikke ka uuringu päeval (taimeteed, vesi, kohv- soovitatavalt ilma piimata, mahl), kindlasti ei tohi juua punast värvi vedelikke.

Uuringu

teostamine

Uuring kestab umbes 5 - 10 minutit. Endoskoop/rektoskoop viiakse päraku kaudu pärasoolde ning õhuga jämesoolt laiendades on võimalik leida haiguslikke muutuseid. Soole venituse tõttu õhuga võib tunda täiskõhutunnet, surumist ja valu. Peale uuringut võib kohe süüa ja juua, kui ei ole teisiti instrueeritud.

Võimalikud tüsistused ja ohud

- Verejooks proovitükkide võtmise järgselt.
Soole sein perforatsioon ehk mulgustus.
Pöörduda koheselt arsti poole, kui peale uuringut tekivad tugevad valud kõhus; tekib soolest tugev verejooks; tekivad külmavärinad ja kõrge palavik.

Uuringu

tulemuste

selgumine

Uuringu esmased tulemused selguvad kohe. Proovitükkide vastused selguvad 14-21 päeva pärast.

Info ööpäevaringselt telefonil 32 29046

Algallikas: TÜ Kliinikum