

Lugupeetud patsient!

Kaalulangetuse ravimid aeglustavad mao talitlust ja toidumasside edasikandumist sooles. Anesteesias toimuval operatsiooni tõstab nende ravimite tarvitamine riski eluohtlike tüsistuste tekkimiseks: maosisu sattumist kopsu, mis võib põhjustada kopsupõletikku; hingamispuudulikkust ja hingamisparaadi vajadust ning võib lõppeda ka surmaga.

Tüsistuste ennetamiseks:**• tuleb katkestada:**

- süstitavad ravimid *Semaglutiid (Ozempic, Wegovy)*, *dulaglutiid (Trulicity)*, *tirsepatiid (Mounjaro)*
.....päeva enne operatsiooni;
- suukaudsed ravimid *semaglutiid (Rybelsus)*..... päeva enne operatsiooni;

- soovitame **24 tundi enne operatsiooni vältida tahke toidu söömist ja pidada selge vedeliku dieeti;**
- operatsioonipäeval on lubatud kuni 2 tundi enne operatsiooni juua vett, teed, musta kohvi, selget viljalihata mahla. **2 tundi enne operatsiooni on keelatud kõik joogid;**
- operatsioonipäeval **EI TOHI 6 tundi enne operatsiooni süüa, juua piimatooteid ja viljalihaga mahla;**
- **võib anestezioloog eelistada üldnarkoosile teisi, ärkvel anesteesia meetodeid (regionaalanesteesia),** kui see on võimalik;
- võib anestezioloog teostada täiendavaid uuringuid (nt mao ultraheli) enne operatsiooni;
- juhul, kui magu on siiski täitunud, võidakse Teie tervise huvides operatsioon edasi lükata või ära jätta.