

Lugupeetud patsient!

Kehakaalu langetavad ravimid aeglustavad mao talitlust ja toidumasside edasikandumist sooles. Anesteesias toimuval operatsiooni tõstab nende ravimite tarvitamine riski eluohtlike tüsistuste tekkimiseks: maosisu sattumist kopsu, mis võib põhjustada kopsupõletikku; hingamispuudulikkust ja hingamisaparaadi vajadust ning võib lõppeda ka surmaga.

- **Tüsistuste ennetamiseks tuleb ravimi tarvitamine katkestada õigeaegselt. Viimane annus tuleb manustada:**
 - süstitavad ravimid semaglutiid (*Ozempic, Wegovy*), dulaglutiid (*Trulicity*), tirsepatiid (*Mounjaro*):
 - 7 päeva enne operatsiooni, kui näidustuseks on veresuhkruhaigus;
 - 14 päeva enne operatsiooni, kui näidustuseks on kaalu langetamine;
 - suukaudsed ravimid semaglutiid (*Rybelsus*):
 - 1 päev enne operatsiooni.
- **24 tundi enne operatsiooni soovitame vältida tahke toidu söömist ja pidada selge vedeliku dieeti.**
- Operatsioonipäeval on lubatud kuni 2 tundi enne operatsiooni juua vett, teed, musta kohvi, selget viljalihata mahla. **2 tundi enne operatsiooni on keelatud kõik joogid.**
- **Operatsioonipäeval EI TOHI 6 tundi enne operatsiooni süüa, juua piimatooteid ja viljalihaga mahla.**
- Anestesioloog võib üldnarkoosi asemel eelistada teisi, ärkvel anesteesia meetodeid (regionaalanesteesia), kui see on võimalik.
- Anestesioloog võib teostada täiendavaid uuringuid (nt mao ultraheli) enne operatsiooni.
- Juhul, kui magu on siiski täitunud, võidakse Teie tervise huvides operatsioon edasi lükata või ära jätta.