

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ОБ АНЕСТЕЗИИ

Дополнительная информация: препараты для снижения веса

Уважаемый пациент!

Препараты для снижения веса замедляют опорожнение желудка после еды. При проведении операции под анестезией их прием повышает риск опасных для жизни осложнений: попадание содержимого желудка в дыхательные пути может привести к пневмонии и дыхательной недостаточности.

- **Для предотвращения осложнений прием препарата необходимо своевременно прекратить.**
 - **Инъекционные препараты – не вводите препараты для снижения веса в течение недели перед операцией:**
 - семаглутид (*Ozempic, Wegovy*)
 - дулаглутид (*Trulicity*)
 - тирзепатид (*Mounjaro*).

NB! Последнюю инъекцию можно сделать за 8 дней до операции!

- **Пероральные препараты – последнюю таблетку можно принять за день до операции:**
 - семаглутид (*Rybelsus*)

-
- **Важно! Необходимо строго соблюдать ограничения в питании и приеме жидкости перед операцией.**

- **За день до операции:**
 - **есть разрешается только утром;**
 - если в отделении предлагают обед или ужин, откажитесь!
 - в течение дня запрещено употреблять молочные напитки, смузи и бульоны;
 - **разрешено пить воду** и сладкие напитки: чай, черный кофе, сок без мякоти, прохладительные напитки. Рекомендуется пить больше обычного!
- **В день операции:**
 - **есть нельзя!**
 - **можно пить воду до 6:00 утра**, а если операция назначена не на утро – не позднее чем за 2 часа до ее начала.
- **По прибытии в отделение обязательно сообщите сестре, что принимаете препараты для снижения веса. Возьмите этот информационный лист с собой в больницу!**

-
- Анестезиолог при необходимости может выбрать альтернативные методы анестезии (регионарную анестезию или местное обезболивание) вместо общего наркоза. Если при дополнительном обследовании (например, ультразвуковом исследовании) выяснится, что желудок не пуст, операция в целях вашей безопасности может быть отложена.